

MRI用造影剤 製剤別適応一覧表

日本医学放射線学会 造影剤安全性委員会 2025年4月改訂

分類	造影剤 製品名(販売会社) 略号	キレート構造	添付文書		NSFリスク分類		投与経路	脳・脊髄 躯幹部・四肢	肝臓	消化管
			重篤な腎障害のある患者の記載区分	効能・効果に関連する使用上の注意の記載*	ESURガイドライン (ver.10.0)	ACRマニュアル 2024				
細胞外液性 造影剤	プロハンス(ブラッコ・ジャパン) ガドテリドール静注シリンジ「HK」(光製薬)※ Gd-HP-DO3A	非イオン性 環状型	特定の背景を有する患者に関する注意	(1)	Lowest risk	Group II	静脈内投与	○		
	マグネスコープ(ゲルベ・ジャパン) ガドテル酸メグルミン静注シリンジ「GE」※ (GEヘルスケアファーマ) Gd-DOTA	イオン性 環状型	特定の背景を有する患者に関する注意	(1)	Lowest risk	Group II	静脈内投与	○		
	ガドピスト(バイエル) Gd-BT-DO3A	非イオン性 環状型	特定の背景を有する患者に関する注意	(1)	Lowest risk	Group II	静脈内投与	○		
肝特異性 造影剤	リゾピスト(PDRファーマ)						静脈内投与		○	
	EOB・プリモピスト(バイエル) Gd-EOB-DTPA	イオン性 線状型	特定の背景を有する患者に関する注意	(1)	Intermediate risk	Group II	静脈内投与		○	
経口消化管 造影剤	フェリセルツ(大塚製薬)						経口投与			○
	ボースデル(健栄製薬)						経口投与			○

※: 後発医薬品

○: 電子化された添付文書(電子添文)において適応とされる項目

*効能又は効果に関連する使用上の注意の記載
 (1) ガドリニウム造影剤を複数回投与した患者において、非造影T1強調MR画像上、小脳歯状核、淡蒼球等に高信号が認められたとの報告や脳の剖検組織からガドリニウムが検出されたとの報告があるので、ガドリニウム造影剤を用いた検査の必要性を慎重に判断すること

【ACRマニュアル NSFリスク分類】

- Group I : Agents associated with the greatest number of NSF cases
- Group II : Agents associated with few, if any, unconfounded cases of NSF
- Group III : Agents for which data remains limited regarding NSF risk, but for which few, if any unconfounded cases of NSF have been reported